






П.4. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на судне и водных объектах.


No	Вопрос	Иллюстрация	Варианты ответа (правильный выделен)
П.4.1	Как следует подходить на маломерном судне для спасения тонущего при ветреной погоде?		• Лечь в дрейф с подветренной стороны и подать спасательный круг • По ветру на малом ходу • Против ветра на малом ходу • За несколько метров от тонущего лечь в дрейф с наветренной стороны
П.4.2	На сколько градусов рекомендуется переложить руль в наветренную сторону сразу после падения человека за борт, чтобы осуществить подход к нему с оборотом на обратный курс?		• На 5 град • На 20 град • На 30 град • На 10 град
П.4.3	Как следует подходить для спасения тонущего на течении?		• а - по течению • б - течение в правый борт • г - течение в левый борт • в - против течения


П.4.4	Как следует подходить к аварийному судну, имеющему большой крен на борт?		• К носу • К корме • К притопленному борту • К приподнятому над водой борту
П.4.5	Какой из перечисленных способов может применяться для подхода к перевернувшемуся судну для снятия с него людей?		• С подветренной стороны под некоторым углом • С наветренной стороны отдать якорь и, потравливая якорный канат (цепь), спускаться к аварийному судну • Держаться носом на ветер на небольшом удалении от перевернувшегося судна и подавать людям спасательные средства (круги, концы и др.) • Любой из перечисленных в зависимости от обстановки
П.4.6	Как следует подходить на маломерном судне к аварийному протопленному судну для оказания помощи людям при плохих погодных условиях?		• Подойти к корме или носу аварийного судна и пересадить людей на борт • Ошвартоваться с наветренного борта и пересадить людей на борт • Ошвартоваться с подветренного борта и пересадить людей на борт • Держаться с подветренной стороны на длинном, незакрепленном на своем судне конце и подать спасаемым людям бросательные концы с огонами (петлями), спасательные круги с линиями

П.4.7	Какое из перечисленных условий необходимо соблюдать при подходе к аварийному судну, если оно притоплено "А1", имеет большой крен "А2" или дифферент "А3"?		• Конец на судне - спасателе крепится только при подаче его на аварийное судно "А2" • Поданный на аварийные суда "А1" и "А2" конец на судне - спасателе не крепится, а на "А3" - крепится • Поданный на аварийное судно "А1" конец на судне - спасателе не крепится, а на суда "А2" и "А3" - крепится • Поданный на любое из аварийных судов "А1", "А2", "А3" конец на судне - спасателе не крепится
П.4.8	Как должен маневрировать судоводитель катера (моторной лодки), если при подходе к упавшему за борт с поворотом на 360 градусов не удалось остановиться наветренное пострадавшего?		• Работая двигателем пытаться зацепить спасаемого багром за одежду • Изменить схему подхода к упавшему за борт с поворотом на 180 град • Повторить подход с разворотом на 360 град • Подходить с помощью весел, используя бросательный конец
П.4.9	Что должен предпринять член экипажа маломерного судна, если он увидел упавшего за борт человека?		• Объявить: "Человек за бортом"; далее действовать по указаниям судоводителя. • Объявить: "Человек за бортом" и показывать рукой в направлении места, где находится упавший. • Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт спасательный круг; далее действовать по указаниям судоводителя. • Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт в сторону падения спасательный круг и показывать рукой в направлении места, где находится упавший; вести наблюдение за ним.

П.4.10	Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве дезинфицирующего средства?		• Намазать раствором только кожу вокруг раны • Намазать раствором всю поверхность раны • Нанести раствором сетку на коже вокруг раны • Намазать раствором всю поверхность раны и кожу вокруг раны
П.4.11	Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке?		• Положить пострадавшего и приподнять ноги • Посадить пострадавшего • Положить пострадавшего и приподнять голову • Положить пострадавшего и начать искусственное дыхание
П.4.12	Какое положение следует придать пострадавшему без видимых наружных повреждений, находящемуся без сознания, после проведения сердечнолегочной реанимации?		• Лежа на боку. Под голову, повернутую в сторону, подложить верхнюю руку пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в колене и положить на землю • Лежа на правом боку • Лежа на спине с валиком под головой • Лежа лицом вниз. Под лоб положить руку


П.4.13	Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при повреждении позвоночника?		• Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность • Уложить пострадавшего на правый бок • Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность • Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть на бок
П.4.14	Как правильно оказать первую медицинскую помощь при вывихе конечности?		• Наложить глухую повязку на поврежденную конечность • Постараться вправить вывих • Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность • Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной водой
П.4.15	В каком случае для остановки кровотечения следует накладывать жгут?		• Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки • Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки • Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения • Если все перечисленные способы не дали положительного результата

П.4.16	Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку в бессознательном состоянии, без видимых наружных повреждений?		• Подложить под ноги валик • Поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, приподнять голову • Проверить пульс на сонной артерии и приступить к искусственному дыханию • Проверить наличие дыхания и пульса для определения дальнейших действий
П.4.17	Выберите правильный способ наложения шины при переломе костей голени?		• Наложить шину с наружной стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов • Наложить шину на голень • Наложить шину с внутренней стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов • Наложить две шины - с наружной и внутренней сторон ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов
П.4.18	Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку, находящемуся в состоянии шока?		• Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать нашатырный спирт • Проверить пульс и измерить температуру тела • Придать положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить холодные примочки • Уложить, укрыть, дать болеутоляющие средства, контролировать дыхание и пульс


П.4.19	Выберите правильный способ остановки артериального кровотечения?		• Зажать рукой сосуды выше места ранения • Наложить жгут ниже места ранения • Наложить давящую повязку на место ранения • Наложить жгут выше места ранения
П.4.20	Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при переломе ключицы?		• Наложить две шины на плечо • Подвесить руку на косынке • Оставить руку опущенной вниз • Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и прибинтовать к туловищу
П.4.21	Выберите правильный способ остановки венозного кровотечения?		• Зажать рукой сосуды выше места ранения • Наложить жгут ниже места ранения • Наложить жгут выше места ранения • Наложить давящую повязку на место ранения

П.4.22	Выберите правильный способ применения бактерицидной салфетки?		• Наложить бактерицидную повязку, предварительно обработав ее раствором йода • Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку • Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку • Не обрабатывая раны, наложить бактерицидную повязку и зафиксировать ее
П.4.23	Что необходимо выполнить при искусственной вентиляции легких "рот в рот"?		• Наклонить вперед голову пострадавшего • Положить пострадавшего на бок • Повернуть голову пострадавшего на правый бок • Выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой на затылок голове
П.4.24	Выберите правильную последовательность действий, в которой следует оказывать помощь пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, если у него отсутствуют дыхание и пульс?		• Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких. • Искусственная вентиляция легких. • Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей. • Освобождение дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца.

П.4.25	Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при переломе плечевой кости?		• Наложить шины с наружной и внутренней стороны плеча, подложить валик из мягкой ткани в подмышечную область, согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать косыночными повязками через шею и вокруг туловища; • Наложить повязку только на поврежденное плечо; • Наложить шину с наружной стороны плеча и туго прибинтовать руку к туловищу; • Прибинтовать поврежденное плечо к туловищу.
П.4.26	Что необходимо выполнить при носовом кровотечении у пострадавшего?		• Положить пострадавшего на спину • Положить пострадавшего на живот и обеспечить охлаждение переносицы • Придать пострадавшему положение полусидя, запрокинуть голову назад • Придать пострадавшему положение полусидя, голову наклонить вперед, обеспечить охлаждение переносицы
П.4.27	Какими признаками характеризуется "синее" утопление?		• Цвет кожи на ушных раковинах пострадавшего фиолетово-синей окраски • Цвет кожи на кончиках пальцев и покровах слизистых губ фиолетово-синей окраски. • Утопление возникает в результате попадания воды в альвеолы легких и прекращении дыхания. • Все перечисленные характеристики

П.4.28	Какова должна быть, в среднем, глубина надавливаний на грудную клетку при проведении сердечно-легочной реанимации для взрослого человека?		• 3-4 см • 7-8 см • 10-12 см • 5-6 см
П.4.29	Какова должна быть частота надавливаний на грудную клетку при проведении сердечно-легочной реанимации для взрослого человека?		• 100-120 надавливаний в минуту • менее 80 надавливаний в минуту • Более 120 надавливаний в минуту • 80-100 надавливаний в минуту
П.4.30	Для чего могут применяться толчки на верхнюю часть живота пострадавшего?		• Для искусственной вентиляции легких. • Для удаления инородного тела из пищевода. • Для уменьшения болевого синдрома при переломе ребер. • Для удаления инородного тела из верхних дыхательных путей.

П.4.31	Для чего применяется приведенный на иллюстрации прием?		• Для определения наличия дыхания. • Для определения частоты дыхания. • Для определения наличия повреждения трахеи. • Для определения частоты пульса.
П.4.32	Какой из перечисленных признаков является основным признаком перелома костей?		• Ограничение подвижности • Бледность тканей • Отечность тканей • Нехарактерный изгиб кости
П.4.33	Какой признак является основным признаком травмы позвоночника?		• Потеря контроля за функцией тазовых органов • Повышенное артериальное давление • Отсутствие сознания • Выраженная боль в области травмы

П.4.34	Какой способ транспортировки является предпочтительным при переломе позвоночника?		• На стуле. • На мягких носилках. • Все перечисленные способы одинаково допустимы. • На плоской твердой поверхности
П.4.35	Какую наибольшую опасность представляют закрытые травмы грудной клетки и брюшной полости?		• Нарушение пищеварения. • Нарушение функции дыхания. • Выраженный болевой синдром. • Повреждение сосудов с развитием скрытого кровотечения.
П.4.36	Определите основной признак ушиба головного мозга.		• Потеря памяти. • Тошнота, рвота. • Спутанность сознания. • Неравенство размеров зрачков.

П.4.37	Определите основной признак ожога верхних дыхательных путей.		• Осиплость голоса. • Отсутствие сознания. • Тяжелое, частое дыхание. • Кашель с черной мокротой.
П.4.38	Какие мероприятия не рекомендуется выполнять при первичном лечении ожогов?		• Бинтовать поврежденную область. • Прикладывать лед к поврежденной области. • Охлаждать холодной водой поврежденную область. • Отрывать прилипшую к коже одежду.
П.4.39	Определите правильный порядок действий по оказанию первой помощи при гипотермии?		• Укутывание, прием небольшого количества алкоголя. • Раздевание, прием теплого питья, массажирование конечностей • Раздевание, массажирование конечностей • Помещение в теплое место, раздевание, укутывание, согревание.

П.4.40	Что необходимо сделать при гипертермии?		• Опустить пострадавшего за борт • Перенести пострадавшего в прохладное помещение и укрыть влажной тканью. Напоить теплым чаем • Положить пострадавшего в тени и поливать заборной водой • Перенести пострадавшего в прохладное помещение и укрыть влажной тканью. Напоить прохладной водой.
П.4.41	Что необходимо сделать для оказания первой помощи при порезах?		• Наложить давящую повязку. • Наложить жгут выше пореза, забинтовать. • Промыть порез перекисью водорода, далее физиологическим раствором, рану оставить открытой. • Промыть порез перекисью водорода, далее физиологическим раствором, забинтовать, при продолжающемся кровотечении поменять повязку.
П.4.42	В течение какого времени наступает смерть клеток головного мозга в отсутствии поступления кислорода на фоне нормальной температуры тела?		• Через 2-3 минуты • Через 10-15 минут • Через 20-30 минут • Через 4-6 минут

П.4.43	Что необходимо сделать для оказания первой помощи извлеченному из воды человеку без сознания?		• Согреть • Согреть, эвакуировать воду из легких. • Очистить верхние дыхательные пути. Согреть. • Оценить наличие пульса и дыхания. Произвести реанимационные мероприятия. Согреть.
П.4.44	Какова цель придания пострадавшему восстановительной позиции, приведенной на рисунке?		• Обеспечение комфортного положения пострадавшему. • Оценка состояния пострадавшего, облегчение дыхания и сердцебиения. • Оценка состояния, восстановление притока крови к голове. • Оценка состояния, предотвращение попадания рвотных масс в дыхательные пути, подготовка к транспортировке.
П.4.45	О чем свидетельствует сужение зрачков у пострадавшего при проведении реанимационных мероприятий?		• О недостаточном снабжении мозга кислородом. • Изменения размера зрачков происходит беспричинно. • О смерти мозга. • О восстановлении снабжения мозга кислородом.